



## Der neue Impfplan 2021 „2+1“

Wir schlagen Ihnen die vom BAG und der eidgenössischen Kommission für Impffragen empfohlenen Produkte und Impfschemen vor. Die Impfungen teilen sich auf in

Grundimmunisierungen : 2 Spritzen im Abstand von 2 Monaten

Boosterimpfungen : 1 Spritze im Abstand eines halben Jahres

Der offizielle Impfplan sieht folgende Alterszeitpunkte/ Intervalle vor

2Monate – 4Monate — 12Monate

Mit 6 Monaten wird dann eine Vorsorgeuntersuchung (ohne Impfung) nötig sein, um die Entwicklung des Kindes zu beurteilen

Eine häufig benutzte Alternative besteht in Impfungen mit 3 und 5 Monaten (anstatt mit 2 und 4 Monaten). Eine zusätzliche Kontrolle mit 6 Monaten entfällt dann.

Der Nachteil am 3 – 5 Schema ist jedoch der etwas spätere Impfschutz, der erst mit 5 Monaten (später als mit 4 Monaten beim 2-4- Schema) vorhanden sein wird.

Die Auffrischungsimpfung (Booster) ist bei beiden Schemata mit 12 Monaten vorgesehen

Mit 9 Monaten wird empfohlen die Masern Mumps Röteln (MMR) Impfung zu machen. Eine notwendige 2. MMR Impfung kann mit den Boosterimpfungen mit 12 Monaten (3 Impfungen gleichzeitig) oder in einer zusätzlichen Konsultation durch die MPA mit 13 Monaten gemacht werden.

Alter	Abkürzung	Inhalt	Krankheit	Kommentar
3m	DTPa-IPV- Hib-(HB)	D Diphtherie T Tetanus Pa Pertussis IPV Polio Hib Haemophilus HB Hepatitis B	Diphtherie Starrkrampf Keuchhusten Kinderlähmung Hirnhautentzündung Leberentzündung	1. Grundimmunisierung
	Prevenar 13	Pneumokokken	Hirnhautentzündung/Blutvergiftung mit Pneumokokken	1. Grundimmunisierung
5m	DTPa-IPV- Hib-(HB) Prevenar 13			2. Grundimmunisierung 2. Grundimmunisierung
9m	Priorix	MMR	Masern - Mumps- Röteln	1. (von 2 Dosen)
12m	DTPa-IPV- Hib-(HB) Prevenar 13			Booster (Auffrischimpfung)
(13m)	Priorix	MMR		Booster (Auffrischimpfung) 2. (von 2 Dosen)
24m	Menveo	Meningokokken ACWY	Hirnhautentzündung mit Meningokokken	Einmalig, Schutz begrenzt

Bei **frühgeborenen** Kindern mit Geburt **vor der 32. Woche** empfiehlt sich das „alte“ 3+1 Schema. Die Vorsorgeuntersuchungen mit Impfungen werden dann im Alter von 2-3-4 und mit 12 Monaten durchgeführt, ergänzt mit einer Kontrolle (ohne Impfung) mit 6 Monaten.

**Mit 24 Monaten** werden wir über den Bedarf nach dem Schutz vor **Meningokokkenerkrankungen** sprechen, hier steht ebenfalls eine Impfung zur Verfügung, die als „ergänzende“ Impfung im Impfplan zusätzlich gelistet ist.